

Treatfip.org™

GS-441524 주사 (15mg/ml)

1. 일반명

GS-441524 주사

2. 활성 성분

GS-441524.....	90 mg
에탄올.....	237 mg
프로필렌글리콜.....	1872 mg
PEG.....	3051 mg
희석 염산.....	1260 mg

3. 효능 및 효과

이 주사는 고양이의 감염성 복막염 (FIP) 치료에 효과적입니다. FIP 는 고양이 코로나바이러스 (FCoV)에 의해 일어나는 바이러스성 질환으로, 고양이에게 복막의 심각하고 종종 치명적인 염증을 일으킵니다.

4. 용량 및 투여 방법

고양이의 감염성 복막염 (FIP) 치료를 위한 Treatfip.org™ GS-441524 INJECTION 의 권장 용량은

다음과 같습니다:

Wet FIP 의 경우: 0.4 ml/kg 로 시작하여 24 시간마다 투여합니다. 심한 경우에는 0.5 ml/kg 로 증가시킵니다.

Dry FIP 의 경우: 0.6 ml/kg 로 시작하여 24 시간마다 투여합니다. 심한 경우에는 0.7 ml/kg 로 증가시킵니다.

Ocular FIP 의 경우: 0.7 ml/kg 로 시작하여 24 시간마다 투여합니다. 심한 경우에는 0.8 ml/kg 로 증가시킵니다.

Neurological FIP 의 경우: 0.8 ml/kg 로 시작하여 24 시간마다 투여합니다. 심한 경우에는 1.0 ml/kg 로 증가시킵니다.

투여 방법

피하 주사를 위해 고양이 목뒤의 피부 주름을 들어 올리고, 45 도 각도로 주사 바늘을 삽입하고, 주사량을 천천히 주입합니다. 주사 부위를 교차로 바꾸고, 수의사 지시에 따라 부작용을 모니터링합니다.

5.금기

GS-441524 또는 그 구성 요소에 과민증이 있는 경우.

6.주의 사항

현지 반응: 주사 부위에서 발적, 부종, 통증 또는 열감.

알레르기 반응: 발진, 두드러기, 숨이 차거나 기타 알레르기 증상.

위장 특별한 주의사항: 메스꺼움, 구토, 또는 설사.

7.임신 및 수유 중 사용

임신 중 및 수유 중인 경우 GS-441524 주사를 사용하기 전에 의사와 상의해야 합니다. 임신 또는 수유 중에 GS-441524 주사를 사용해야 하는 경우 잠재적인 위험과 혜택을 신중히 평가해야 합니다.


8.약물 상호 작용

리신은 GS-441524 의 효과에 영향을 줄 수 있습니다. 면역 기능에 필수적인 아르기닌과 상반되므로 리신을 절대 투여해서는 안 됩니다. GS-441524 의 주사용 용액에는 에탄올이 포함되어 있어 세팔로스포린 계열 약물과 동시에 투여될 때

디설퍼람과 유사한 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서 GS-441524 를 주사할 때는 세팔로스포린 계열 약물과의 동시 투여가 권장되지 않습니다.

9.제품 설명

GS-441524 는 FIPV 뉴클레오티드 아날로그 RNA 폴리머레이즈 억제제로, 화학적 명칭은 (5aR,6aR,7R,9S)-9-(2,3-다이하이드록시프로필)-7-메틸-2-(트리플루오로메틸)-7,8,9,10-테트라하이드로-6H-피리도[4,3,2-de]프탈라진-6-원 입니다. 분자식은 $C_{12}H_{13}N_5O_4$ 이며, 분자량은 291.26 g/mol 입니다. GS-441524 의 구조식은 다음과 같습니다:



10.저장

30℃ 를 초과하지 않는 온도에서 수분을 보호하여 저장하십시오. 동결하지 마십시오. 어린이의 손에 닿지 않도록 보관하십시오.

11.발매일

의약품 정보 시트의 최종 업데이트 또는 발매일:
2021년 12월.

한국어 버전

Treatfip.org